

Aa

A. achalensis,
A. fiebrigii,
A. hieronymii,
A. paludosa
(*Myrosmodes paludosa*-
Kew).
A. weddelliana.

Acianthera

A. aphthosa,
A. aurantio-lateritia,
A. boliviana,
A. crinita,
A. klotzschiana,
A. luteola,
A. macuconensis,
A. pubescens,
A. recurva,
A. saundersiana,
A. sonderiana.

Anathallis

A. limbata.
A. linearifolia,
A. obovata.

Apoda-prorepentia

A. hystrix (*Acianthera*
hystrix-Kew).

Arthrosia

A. hygrophila
(*Acianthera hygrophila*-
Kew).
A. muscosa (*Acianthera*
muscosa-Kew).

Aspidogyne

A. bidentifera,
A. bruxellii,
A. kuczynskii,
A. lindleyana,
A. malmei.

Barbosella

B. cogniauxiana.

Beloglottis

B. boliviensis.

Bipinnula

B. biplumata.

Bletia

B. catenulata,
B. wagneri (*Bletia*
campanulata-Kew).

Brachystele

B. burkartii,
B. camporum,
B. chlorops,
B. cyclochila,
B. dilatata,
B. unilateralis,
B. widgrenii

Brassavola

B. tuberculata.

Bulbophyllum

B. napellii,
B. regnellii,
B. tripetalum.

Campylocentrum

C. aromaticum,
C. densiflorum,
C. grisebachii,
C. negletum,
C. pauloense,
C. ulae.

Capanemia

C. micromera,
C. superflua.
C. brachycion

Catasetum

C. fimbriatum.

Chloraea

C. alpina,
C. barbata,
C. bella,
C. bidentata,
C. biserialis,

C. boliviana,
C. castillonii,
C. chica,
C. chrysochloa
(*Chloraea lechleri*-
Kew).
C. cogniauxii,
C. cylindrostachya,
C. disoides (var. *picata*),
C. elegans,
C. gaudichaudii
(*Chloraea fonckii*-
Kew).
C. laxiflora,
C. magellanica,
C. membranacea,
C. philippii,
C. phoenicea,
C. praecineta,
C. reticulata,
C. speciosa,
C. subpandurata,
C. virescens (*Chloraea*
piquichen-Kew).
C. viridiflora,
C. volkmannii.

Cleistis

C. ramboi.

Codonorchis

C. lessonii.

Corymborkis

C. flava.

Cranichis

C. candida,
C. castellanosii,
C. ciliata.

Cyanaeorchis

C. arundinae.

Cyclopogon

C. apricus,
C. bicolor,

C. calophyllus,
C. congestus,
C. elatus,
C. elegans,
C. longibracteatus,
C. oliganthus,
C. polyaden
(*Stigmatosema*
polyaden- Kew),
C. subalpestris,
C. variegatus.

Cyrtopodium

C. brandonianum,
C. hatschbachii,
C. palmifrons,
C. pflanzii,
C. puntactum.

Eltroplectris

E. lurida (*Pteroglossa*
lurida-Kew),
E. roseoalba
(*Pteroglossa roseoalba*-
Kew).
E. schlechteriana ,
E. travassosii
(*Pteroglossa*
travassosii- Kew).
E. triloba.

Encyclia

E. argentinensis.

Epidendrum

E. densiflorum,
E. paniculatum-Kew,
E. rigidum,
E. samaipatenense.

Epistephium

E. sclerophyllum.

Eulophia

E. alta.

Eurystyles

E. actinosophila.

Galeandra

G. beyrichii,
G. graminoides,

G. hysterantha,
G. stylomisantha.

Gavilea

G. araucana,
G. australis,
G. glandulifer,
G. littoralis,
G. lutea,
G. odoratissima,
G. supralabellata,
G. trullada (*Gavilea*
kingii-Kew),
G. wittei (*Gavilea*
patagonica-Kew).

Geoblasta

G. penicillata.

Gomesa

G. planifolia,
G. recurva.

Govenia

G. utriculata.

Habenaria

H. bractescens,
H. distans,
H. ekmaniana,
H. gourlieana,
H. guentheriana,
H. hassleriana,
H. hexaptera,
H. lindmaniana
(*Habenaria schenckii*-
Kew),
H. obtusa,
H. paiveana,
H. parviflora,
H. paucifolia
(*Habenaria regnellii*-
Kew).
H. petalotes,
H. regnellii,
H. repens,
H. rupicola,
H. secunda,
H. trifida,
H. uruguayensis,

H. warmingii.

Hapalorchis

H. lineatus.

Isabelia

I. virginalis.

Isochilus

I. linearis.

Lankesterella

L. ceracifolia.

Leptotes

L. unicolor.

Ligeophila

L. juruenensis,
L. rosea.

Liparis

L. nervosa.
L. vexillifera

Malaxis

M. excavata,
M. hieronymi,
M. padilliana,
M. parthoni.

Maxillaria

M. chrysantha
(*Brasiliorchis*
chrysantha-Kew).
M. picta
(*Brasiliorchis picta*-
Kew).
M. spgazziniana,
M. vitelliniflora
(*Christensonella*
vitelliniflora- Kew)

Mesadenella

M. cuspidata.

Microchilus

M. arietinus.

Microlaelia

M. lundii (Cattleya lundii-Kew).

Miltonia

M. flavescens,
**Miltonia flavescens* variedad. no establecida aún, de medio labelo morado.

Octomeria

O. chamaeleptotes,
O. micrantha,
O. pinicola.

Odontorrhynchus

O. castillonii.

Oeceoclades

O. maculata.

Oncidium

O. bifolium var. *bifolium*
(*Gomesa bifolia*(Sims)-Kew).

O. bifolium var. *majus*
(*Gomesa bifolia* var. *majus*-Kew).

**O. bifolium* variedad no establecida llamada federal
(**Gomesa bifolia* variedad no establecida llamada federal-Kew).

O. concolor
(*Gomesa concolor*-Kew).

O. edwalli
(*Grandiphyllum edwallii*-Kew).

O. fimbriatum
(*Gomesa cornigera*-Kew).

O. flexuosum
(*Gomesa flexuosa*-Kew).

**O. fuchsii* especie aún no citada para la

Argentina, presentado a veces como *G. viperina*,

O. herzogii,
O. longicornu
(*Gomesa longicornu*-Kew).

O. longipes
(*Gomesa longipes*-Kew).

O. maculosum
(*Gomesa bifolia*-Kew).

O. paranaense
(*Gomesa paranensoides*-Kew).

O. pubes
(*Gomesa pubes*-Kew).

O. pulvinatum
(*Grandiphyllum Divaricatum*-Kew).

O. riograndense
(*Gomesa riograndensis*-Kew).

O. varicosum
(*Gomesa varicosa*-Kew).

O. verrucosissimum
(*Gomesa brieniana*-Kew).

O. viperinum
(*Gomesa viperina*-Kew).

Pabstiella

P. aveniformis
(*Acianthera aveniformis*- Kew),
P. tripterantha.

Pachygenium

P. bonariensis (*Pelexia bonariensis*- Kew).

Panmorphia

P. limbata (*Anathallis limbata*-Kew).

Pelexia

P. ekmanii,

P. laxa,
P. lindmaniana (*Pelexia laxa*-Kew).

P. lindmanii,
P. novofriburgensis,
P. ovatifolia,
P. paludosa.

Phloeophila

P. similis

Phymatidium

P. delicatulum.

Platythelys

P. platensis.

Pleurobotryum

P. hatschbachii
(*Pleurothallis hatschbachii*- Kew)
P. rhabdosepalum
(*Pleurothallis rhabdosephala*-Kew)

Pleurothallis

P. microphyta,
P. pectinata
(*Acianthera pectinata*-Kew).

Polystachya

P. concreta,
P. foliosa.

Ponthieva

P. mandonii var. *bilobipetala*,
P. mandonii var. *mandonii*.

Prescottia

P. oligantha,
P. serrana ,
P. stachyodes.

Pterichis

P. boliviana,
P. multiflora.

Pteroglossa

P. luteola,
P. regia,
P. rhombipetala
(*Pteroglossa roseoalba*-
Kew).

Pteroglossaspis

P. argentina (*Eulophia*
ruwenzoriensis- Kew).

Rodriguezia

R. decora.

Sacoila

S. argentina,
S. lanceolata,
S. pedicellata (*Sacoila*
lanceolata-Kew).
S. secundiflora (*Sacoila*
lanceolata- Kew).

Sanderella

S. discolor,
S. riograndensis.

Sarcoglottis

S. fasciculata,
S. grandiflora,
S. homalogastra,
S. magdalenensis,
S. uliginosa,
S. ventricosa.

Sauroglossum

S. nitidum,
S. sellilabre.

Schidorrhynchos

S. andinum
(*Sauroglossum*
andinum- Kew).

Skeptrostachys

S. balanophorastachya,
S. correana,
S. disoides,
S. gigantea,
S. paraguayensis.

Sophronitis

S. cernua
(*Cattleya cernua*-
Kew).
S. coccinea
Cattleya coccinea-
Kew).

Specklinia

S. grobyi,
S. matinhensis
(*Pleurothallis*-
matinhensis Kew).

Stanhopea

S. xytriphora.

Stigmatosema

S. odileana.

Synanthes

S. bertonii (*Eurystyles*
bertonii-Kew).

Trichocentrum

T. cebolleta,
T. jonesianum,
T. pumilum.

Triphora

T. hassleriana.

Vanilla

V. chamissonis,
V. edwallii,
V. rojasiana.

Veyretia

V. hassleri,
V. neuroptera,
V. sagittata.

Warmingia

W. eugenii.

Warrea

W. warreana.

Wulfschlaegelia

W. aphylla.

Zygopetalum

Z. maxillare.

Zygostates

Z. alleniana.

